

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



ВЛАСОВ Н.А.

30 НОЯ 2016

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Бутацифол для нормализации обмена веществ, повышения естественной резистентности свиней и сельскохозяйственной птицы

(Организация-производитель ООО «Белфармаком», г. Белгород)

I. Общие сведения

1. Бутацифол (Butacyfol) – кормовая добавка для нормализации обмена веществ, повышения естественной резистентности свиней и сельскохозяйственной птицы.

2. В 1 мл в качестве действующих веществ содержится: бутафосфана – 100 мг, цианокобаламина – 0,1 мг, фолиевой кислоты – 2 мг, а также вспомогательные компоненты: N-метилглюкамин, бутанол и вода очищенная до 1 мл. Допустимые отклонения содержания компонентов составляют не более 15%.

Кормовая добавка не содержит генно-модифицированных продуктов.

3. По внешнему виду добавка представляет собой прозрачную жидкость от красного до коричневого цвета.

4. Выпускают кормовую добавку в форме раствора, расфасованного по 1, 2, 5 мл в стеклянные или полимерные ампулы, по 10, 20, 50, 100 мл в стеклянные или полимерные флаконы, по 250, 500 и 1000 мл в стеклянные или полимерные бутылки, по 2, 5, 10, 20, 25 л в полимерные канистры, укупоренные завинчивающимися пластиковыми крышками с контролем первого вскрытия.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: организации-производителя, её адреса и товарного знака, названия кормовой добавки, назначения, способа применения, состава и гарантированных показателей, обозначения СТО, объема в единице фасовки, номера партии, срока и условий хранения, регистрационного номера, сведений о соответствии, надписью «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят кормовую добавку в закрытой упаковке производителя в темном сухом месте при температуре от 5 до 25°C.

Срок хранения – 2 года со дня производства. После вскрытия упаковки

кормовую добавку используют в течение 28 дней.

Запрещается применение Бутацифола по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Бутацифол относится к комплексным общеукрепляющим и тонизирующим кормовым добавкам, нормализует метаболические и регенеративные процессы, оказывает стимулирующее действие на белковый, углеводный и жировой обмен веществ, повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует росту и развитию молодняка животных.

6. Входящий в состав добавки бутафосфан способствует улучшению функции печени, стимулирует метаболические процессы, повышает двигательную активность гладкой мускулатуры, стимулирует образование костной ткани.

Цианокобаламин (Витамин В12) активизирует процессы кроветворения, синтеза нуклеиновых кислот, восстанавливает до нормы уровень лимфоцитов-супрессоров, участвует в синтезе метионина, способствует образованию гликогена, мобилизует запасы энергии, необходимые для образования дезоксирибозы и синтеза ДНК.

Фолиевая кислота (Витамин В9) – в организме восстанавливается до тетрагидрофолиевой кислоты, являющейся коэнзимом, участвующим в различных метаболических процессах. Необходима для нормального созревания мегалобластов и образования нормобластов. Стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокислот (в том числе глицина, метионина), нуклеиновых кислот, пуринов, пиримидинов, в обмене холина, гистидина.

III. Порядок применения

7. Бутацифол применяют свиньям и сельскохозяйственной птице для нормализации обмена веществ и повышения естественной резистентности.

8. Дают свиньям и птице — с водой для поения ежедневно в течение 4–5 дней. Рекомендуемые нормы ввода:

Вид животного	Норма ввода	Норма ввода при стрессовых ситуациях, несбалансированном кормлении
Куры-несушки, бройлеры	1,5 – 2,0 мл на 1 л воды для поения	2,0 – 3,0 мл на 1 л воды для поения
Цыплята, ремонтный молодняк	0,5 – 1,0 мл на 1 л воды для поения	1,0 – 1,5 мл на 1 л воды для поения
Поросята-сосуны, подсвинки	1,0 – 1,5 мл на 1 л воды для поения	2,0 – 2,5 мл на 1 л воды для поения

Повторное применение при необходимости проводят с интервалом 5-14 дней.

9. При применении Бутацифол побочные явления и осложнений не выявлено. Противопоказанием к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам добавки.

10. Бутацифол совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

11. Продукцию свиноводства и птицеводства можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

12. Все работы с Бутацифолом следует осуществлять с соблюдением правил личной гигиены и техники безопасности, предусмотренных при работе с кормовыми добавками.

13. Хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана ООО «Белфармаком», г. Белгород.

Адрес организации – производителя ООО «Белфармаком», г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 2а.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ПВР-2-11.16/03309